

## Medicijnen na een beroerte of TIA

Na een beroerte (CVA) of een TIA (een korte voorbijgaande beroerte), worden vaak bloedverduunners voorgeschreven om de kans op herhaling van een beroerte of TIA te verkleinen.

Bloedverduunners zorgen ervoor dat er minder snel stolsels in het bloed ontstaan. Het zorgt er dus voor dat het bloed 'dun' genoeg blijft. Zo is de kans kleiner dat er weer een bloedvat verstopt raakt en er een nieuwe **beroerte** (<https://www.antoniusziekenhuis.nl/node/9220>) ontstaat.

## Meer over medicijnen na een beroerte of TIA

Op de website [www.apotheek.nl](http://www.apotheek.nl) (<http://www.apotheek.nl>) staat meer informatie over medicatie bij een beroerte. Zoek op deze website op de naam van het medicijn.

**Kijksluiter** (<https://www.kijksluiter.nl/#!>) is een bibliotheek met animatievideo's. In deze video's wordt de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke taal uitgelegd. Patiënten kunnen zelf hun medicijn opzoeken. Kijksluiter is beschikbaar in verschillende talen: Nederlands (inclusief ondertiteling voor doven en slechthorenden), Engels, Turks en Arabisch.

Hieronder vindt u een overzicht van medicijnen die voor u belangrijk zijn:

### Antistollingsmedicatie

- Clopidogrel (Plavix of Grepid) gebruikt u levenslang
- Carbasalaatcalcium gebruikt u 21 dagen

### Medicatie na een TIA of herseninfarct met hartritmestoornissen

- Rivaroxaban (Xarelto) of Apixaban (Eliquis): dit zijn direct werkende orale anticoagulantie. Dosering in overleg met uw neuroloog en cardioloog. Er is geen controle bij de Trombosedienst nodig.
- Acenocoumarol (Sintrom): dosering in overleg met de Trombosedienst. De Trombosedienst prikt regelmatig uw bloed om de dosering van de medicijnen te kunnen bepalen.

### Manieren om uw cholesterol te verlagen

Wanneer u een te hoog cholesterol heeft kan dit zorgen voor vernauwing van de vaten. Hierdoor is er een verhoogde kans op een beroerte. Een hoog cholesterol kan verholpen worden door uw levensstijl te veranderen zoals:

- Stoppen met roken
- Gezonder eten
- Meer bewegen
- Geen alcohol te drinken
- Waar nodig af te vallen
- Stress verminderen

Een hoog cholesterol kan ook door medicatie verholpen worden. LDL-cholesterol noemen ze ook wel 'slecht cholesterol'. Bij een hoog LDL-cholesterol is er meer kans op vernauwingen in de slagaders. Medicijnen om het LDL-cholesterol in uw bloed te verlagen zijn:

- Simvastatine
- Atorvastatine
- Rosuvastatine

Meer informatie over welke medicijnen gebruikt worden bij een beroerte [<https://www.apotheek.nl/klachten-ziektes/beroerte#welke-medicijnen-worden->]

## Meer informatie

- Specialisme Neurologie [<https://www.antoniuziekenhuis.nl/node/96>]
- Hersenstichting [<http://www.hersenstichting.nl>]

## Gerelateerde informatie

### Aandoeningen

- Beroerte (CVA) [<https://www.antoniuziekenhuis.nl/aandoeningen/beroerte-cva>]

### Behandelingen & onderzoeken

- Beroerte - onderzoeken [<https://www.antoniuziekenhuis.nl/behandelingen-onderzoeken/beroerte-onderzoeken>]
- Trombolysie bij een beroerte [<https://www.antoniuziekenhuis.nl/behandelingen-onderzoeken/trombolysie-bij-een-beroerte>]
- Beroerte - behandelingen [<https://www.antoniuziekenhuis.nl/behandelingen-onderzoeken/beroerte-behandelingen>]

### Specialismen

- Neurologie [<https://www.antoniuziekenhuis.nl/neurologie>]

Contact Neurologie

T 088 320 39 00